

Toxikománie, AIDS

Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK

Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz.

1. Toxikománie, AIDS

Toxikománie, AIDS

Toxikománie

Je stav, při kterém vzniká chorobná závislost na určitou drogu s následnými poruchami tělesnými nebo duševními.

Typickými rysy toxikomanie jsou:

- neovládnutelná touha po droze
- tendence neustálého zvyšování dávky
- psychická i fyzická závislost na droze

Rozdělení drog

- konopné drogy (marihuana a hašiš)
- opiáty (heroin, směs derivátů kodeinu)
- stimulační látky (kokain, amfetamin a jeho deriváty, např. pervitin)
- halucinogeny (LSD, Psilocybin obsažený v lysohlávce české)
- psychotropní léky (rohypnol, diolan)

Legální drogy

ALKOHOL

- vede k závislosti
- úmrtí na následky zranění
- fetální alkoholový syndrom (postižení plodu)
- degenerace inteligence

NIKOTIN

- postižení srdce a cév
- postižení zažívacího ústrojí
- onemocnění dýchacích cest
- nádorová onemocnění
- na nikotin vzniká silná závislost

Promiskuitní chování

- zneužívání drog nese zvýšené riziko vzniku pohlavních onemocnění.
- drogově závislí ztrácejí zábrany a často se chovají promiskuitně.
- je třeba dávat důraz na zodpovědný výběr partnera.

Druhy venerických chorob

- kapavka (patří mezi nejrozšířenější sexuálně přenosné nemoci na světě. Způsobuje ji gramnegativní bakterie *Neisseria gonorrhoeae*. Onemocnění má obvykle charakter hnisavého zánětu sliznic vylučovacích a pohlavních orgánů, někdy také může zasáhnout konečník, nebo spojivky v očích.)
- měkký vřed (sexuálně přenosná nemoc, jejímž původcem je gramnegativní bakterie *Haemophilus ducreyi*. Projevuje se často mnohočetnými vřídky v oblasti genitálu (u mužů na žaludu penisu, předkožce a uzdičce). V případě neléčení nemoci dochází ke spojování vřídků ve velká ložiska a přenosu infekce do mizních (lymfatických) uzlin v oblasti třísel, jejich následnému zduření, prasknutí a vytvoření píštěle, z níž vytéká žlutozelený hnis s příměsí krve. Nemoc je přenosná pouze pohlavním stykem a její lokalizace mimo genitál je velmi vzácná.)
- granuloma inguinale (je sexuálně přenosná nemoc, jejímž původcem je bakterie *Calymmatobacterium granulomatis*. Tato nemoc, která byla poprvé popsána v roce 1882, postihuje kůži a podkoží genitálií a přilehlých oblastí. Jedná se o vzácnou pohlavní nemoc, která je v některých částech světa endemická, vyskytující se především v tropech a subtropích v oblastech Afriky, jihovýchodní Asie, Karibiku, Austrálie,

Indie, Nové Guineje a dalších převážně rozvojových zemích (v jiných zemích je výskyt způsobem většinou díky migraci).

- syfilis (příjice) - je pohlavně přenosná polysystémová infekce, jejímž původcem je bakterie *Treponema pallidum*, pocházející z kmene spirochét. Nositelem je obvykle osoba v raném stádiu choroby, která jej přenáší pohlavním stykem. Poměrně častá je i infekce plodu během těhotenství nebo při kojení; přenos krví a dotykem je výjimečný, nicméně možný.
- chlamydiózy (pohlavně přenosné infekce močopohlavního ústrojí - mohou být ale infikovány i např. oči nebo hrtan)
- virové hepatitidy A- E
- AIDS

AIDS

z anglického Acquired Immune Deficiency Syndrome nebo též Acquired Immunodeficiency Syndrome, česky Syndrom získaného selhání imunity, francouzsky: Syndrome d'immunodéficience acquise, SIDA, je soubor příznaků a infekcí, který je následkem poškození imunitního systému člověka virem HIV. Nemoc HIV/AIDS byla poprvé zaznamenána v roce 1981 a od té doby se jí nakazily desítky milionů lidí, nejhůře postižené jsou některé africké státy. Přestože se léky na tlumení HIV/AIDS neustále zdokonalují, nemoc stále zůstává téměř vždy nevléčitelnou a smrtelnou.

Obsah

 1. Toxikománie, AIDS

2